


*) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} y \cos x^3 dx dy = ?$ → integrasyonu sırası değiştirilmeli

0: $y = \frac{\pi}{2}$ $y = 0$ $x = y$ $x = \frac{\pi}{2}$




$$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^x y \cos x^3 dy dx = \int_0^{\pi/2} \frac{y^2}{2} \cos x^3 \Big|_0^x dx = \int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{2} \cos x^3 dx$$

$$= \frac{1}{6} \sin x^3 \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{6} \sin \frac{\pi^3}{8}$$

*) $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$ integralini hesaplayın.

0: $y = 0$ $y = 1$ $x = 3$ $x = 3y$




$$I = \int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2} dy dx = \int_0^3 y e^{x^2} \Big|_0^{x/3} dx$$

$$= \int_0^3 \left(\frac{x}{3} e^{x^2} \right) dx = \frac{1}{6} e^{x^2} \Big|_0^3 = \frac{1}{6} (e^9 - 1)$$

*) $\iint_0 (x^2 + y^2) dx dy$ integralini 0: $x^2 + y^2 = 2x$ bölgesinde kutupsal

Koordinatları dönüştürerek yazınız.

$$x^2 + y^2 - 2x = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$



$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned} \right\}$$


$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r^2 \cdot r dr d\theta$$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0$$

$$r^2 - 2r \cos \theta = 0 \quad r = 0 \quad r = 2 \cos \theta$$

* D: $\begin{cases} x^2+y^2-4y=0 \\ y=x \\ x=0 \end{cases}$ olmak üzere $I = \int_0^1 \int_0^{3y-2} (3y-2) dx dy$
 integralinin \uparrow kutupsal dönüşümle sınırlarını yazınız.

$x^2+y^2-4y=0 \rightarrow x^2+(y-2)^2=4 \rightarrow$ Merkezi $(0,2)$ de
 yarıçapı 2 olan çember




$$\begin{cases} x^2+y^2-4y=0 \\ y=x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x^2-4x=0 \\ x=0 \quad x=2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned} \right\} \rightarrow I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{4 \sin \theta} (3r \sin \theta - 2) r dr d\theta \\ &\left. \begin{aligned} x^2+y^2-4y &= 0 \\ r^2 - 4r \sin \theta &= 0 \\ r=0 \quad r &= 4 \sin \theta \end{aligned} \right\} \rightarrow \end{aligned}$$

* D: $\begin{cases} x^2+y^2-4x=0 \\ y=x \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \int_0^1 \int_0^{2x-3} (2x-3) dx dy \rightarrow$ kutupsal dönüşümle sınırları yazın.

$x^2+y^2-4x=0 \rightarrow (x-2)^2+y^2=4 \rightarrow$ Merkezi $(2,0)$
 yarıçapı 2 olan çember



$$\begin{cases} x=r \cos \theta \\ y=r \sin \theta \\ dx dy=r dr d\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2-4x=0 \\ r^2-4r \cos \theta=0 \\ r=0 \quad r=4 \cos \theta \end{cases}$$

$$I = \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \cos \theta} (2r \cos \theta - 3) r dr d\theta$$

16.05.2018

Sevgili MAT2 Öğrencileri,

Hepinize final sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım sorular hep bildiğiniz yerlerden gelir ☺

Gelecek sene bu minik notları okumak zorunda kalmamanız dileğiyle... ☺

Şimdiden iyi tatiller,

Sevgiler...


Pınar Albayrak

* $\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} dy dx = ?$

Integral bu hali ile çözülemez. İntegrasyon sırasını değiştirmeliyiz.

$\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} dy dx$

$\Rightarrow \begin{matrix} x=1 & x=0 \\ y=1 & y=x \end{matrix}$



Sınırları bölgeyi y'ye göre düzenli olarak yazmalıyız.

$$I = \int_0^1 \int_0^y e^{x/y} dx dy = \int_0^1 \frac{e^{x/y}}{\frac{1}{y}} \Big|_0^y dy = \int_0^1 y e^{x/y} \Big|_0^y dy$$

$$= \int_0^1 (y e - y) dy = \frac{y^2}{2} e - \frac{y^2}{2} \Big|_0^1$$

$$= \frac{e}{2} - \frac{1}{2}$$

* $z = x + y$ yüzeyinin altında $R = [0, 1] \times [0, 2]$ dikdörtgeni üstünde bulunan cismin hacmi?

$$V = \iint_R (x+y) dx dy = \int_0^1 \int_0^2 (x+y) dy dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 \right] dx = \int_0^1 (2x+2) dx$$


$$= x^2 + 2x \Big|_0^1 = 3$$

* $f(x,y) = 2x - y$ fonksiyonunu köşeleri $(0,0), (2,0), (2,2), (0,3)$ koordinatları üzerinde olan yamuk üzerinde integre ediniz.

l_1 doğrusu: $(0,3), (2,2)$


$$\frac{x-x_1}{y-y_1} = \frac{x-x_2}{y-y_2} \Rightarrow \frac{x-0}{y-3} = \frac{0-2}{3-2} \Rightarrow x+2y=6$$

$$\boxed{y = 3 - \frac{x}{2}}$$



$$I = \iint_0 (2x-y) dx dy = \int_0^2 \int_0^{3-x/2} (2x-y) dy dx = 3$$

* $z = 1 + 2xy$ nin altında ve $y = x^2$, $y = 2 - x^2$ parabolleri ile sınırlı bölgenin üstünde bulunan T cisminin hacmi?




$$y = x^2, y = 2 - x^2 \Rightarrow x^2 = 2 - x^2 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$V = \iiint_D (1 + 2xy) dx dy = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^{2-x^2} (1 + 2xy) dy dx$$

$$= \int_{-1}^1 y + xy^2 \Big|_{x^2}^{2-x^2} dx$$

$$= \int_{-1}^1 (2 - x^2 + x(2 - x^2)^2 - x^2 - x \cdot x^4) dx = \frac{8}{3}$$

* $x = y^2$, $x = y + 2$ ile sınırlı bölgenin alanı?



$$A = \iint_D dx dy = \int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy = \int_{-1}^2 (y + 2 - y^2) dy$$

$$= \left. \frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right|_{-1}^2$$


$$= \frac{9}{2}$$

$$x = y + 2, y^2 = x \Rightarrow y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1$$

$$y = 2$$

* 2 katlı kutupsal integrasyon ile $y = 1$, $y = \sqrt{3}x$ in altında üzerinde

Kalan ve $y^2 + x^2 = 4$ çemberi ile sınırlı alanı bulun.



$$A = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{1/\sin\theta}^2 r dr d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{r^2}{2} \Big|_{1/\sin\theta}^2 d\theta$$


$$y = 1 \Rightarrow r \sin\theta = 1$$

$$r = \frac{1}{\sin\theta}$$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{2} [4 - \text{cosec}^2\theta] d\theta$$

$$= \frac{1}{2} (4\theta + \cot\theta) \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} = \frac{\pi - \sqrt{3}}{6}$$

* $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2 \\ x > 1 \\ y > 0 \end{cases} \Rightarrow I = \iint_D x \cdot dA$ integralinin sınırlarını kutupsal dönüşüm ile yazınız.




$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dx dy = r dr d\theta \end{cases} \begin{cases} x = 1 \Rightarrow r \cos \theta = 1 \rightarrow \boxed{r = \frac{1}{\cos \theta}} \\ x^2 + y^2 = 2 \Rightarrow r^2 = 2 \rightarrow \boxed{r = \sqrt{2}} \end{cases}$$

$$I = \int_0^{\pi/4} \int_{1/\cos \theta}^{\sqrt{2}} r \cos \theta \cdot r \cdot dr d\theta$$

* $f(x,y) = x \cos xy$ fonksiyonunun $R: \begin{cases} 0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$ bölgesindeki ortalama değerini bulunuz.

$$\bar{f} = \frac{1}{R \text{ nin Alanı}} \cdot \iint_R f(x,y) dA$$




R'nin Alanı = π

$$\iint_R f(x,y) dA = \int_0^{\pi} \int_0^1 x \cos xy \, dy dx$$

$$= \int_0^{\pi} \sin xy \Big|_0^1 dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = -(-1 - 1) = 2$$

$$\bar{f} = \frac{1}{\pi} \cdot 2 = \frac{2}{\pi}$$

S.3-a) $y = \ln(1+x)$ eğrisi ve $x=0$, $y=2$ doğruları ile sınırlanmış bölgenin alanını iki katlı integrale bulunuz



$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^2 \int_0^{e^y-1} dx dy \\
 &= \int_0^2 (e^y - 1) dy \\
 &= (e^y - y) \Big|_0^2 \\
 &= e^2 - 3 \text{ br}^2
 \end{aligned}$$

$$\ln(1+x) = 2 \Rightarrow x = e^2 - 1$$

$$R = \{ (x,y) : 0 \leq x \leq e^2 - 1, \ln(1+x) \leq y \leq 2 \}$$

$$A = \int_0^{e^2-1} \int_{\ln(1+x)}^2 dy dx$$


$$= \int_0^{e^2-1} [2 - \ln(1+x)] dx$$

$$= [2x - ((1+x)\ln(1+x) - x)] \Big|_0^{e^2-1}$$

$$= e^2 - 3 \text{ br}^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \ln(1+x) \\ du = dx \end{array} \right.$$

-b) Üstten $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konisi, alttan $z=0$ düzlemi ve yandan $x^2 + y^2 = 1$ silindiri ile sınırlanan cismin hacmini bulunuz. (Yol Gösterme: R bölgesi, xy -düzleminde $x^2 + y^2 = 1$ dairesidir.)




$$\left. \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 1 \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array}$$

$$V = \iint_R f(x,y) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2} r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^1 d\theta = \frac{2\pi}{3} \text{ br}^3$$

S.4-a) Eğer R , $x+y=1$, $x+y=3$, $x-y=0$ ve $x-y=1$ doğruları ile sınırlanmış bölge ise,



$$x-y=0 \rightarrow u=0$$

$$x = \frac{1}{2}(u+v)$$

$$x-y=1 \rightarrow u=1$$

$$y = \frac{1}{2}(v-u)$$

$$x+y=1 \rightarrow v=1$$


$$x+y=3 \rightarrow v=3$$

I.401

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} = J$$

II.401


$$J = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{2}$$



$$I = \int_0^1 \int_1^3 \frac{1}{2} \frac{uv}{\sqrt{1+u^2}} dv du = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{uv^2}{2\sqrt{1+u^2}} \right]_1^3 du$$

$$= 2 \sqrt{1+u^2} \Big|_0^1 = 2 //$$

b) $\int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1} dy dx$ integralini hesaplayınız



$$R = \{ (x,y) : 1 \leq x \leq 4, \sqrt{x} \leq y \leq 2 \}$$

$$R' = \{ (x,y) : 1 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq y^2 \}$$


$$I = \int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1} dy dx = \int_1^2 \int_1^{y^2} \frac{e^y}{y+1} dx dy = \int_1^2 \frac{e^y}{y+1} (y^2-1) dy$$

$$= \int_1^2 (y-1)e^y dy = (y-2)e^y \Big|_1^2 = e$$

$$\left[\begin{array}{l} u = y-1 \\ dv = e^y dy \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{l} du = dy \\ v = e^y \end{array} \Rightarrow uv - \int v du = (y-1)e^y - \int e^y dy = (y-2)e^y$$

* $I = \int_0^1 \int_0^{1-y} e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy = ?$ $u = x-y$ $v = x+y$ dönüştürme yapılmalı

$O: y=1, y=0, x=0, x=1-y \rightarrow$




Bölgeyi sınırlayan: $x=1-y, x=0, y=0$

$\frac{0}{x+y=1} \rightarrow \frac{0'}{v=1}$
 $x=0 \rightarrow u+v=0$
 $y=0 \rightarrow u-v=0$

$u = x-y$
 $v = x+y$

$$\left\{ \begin{array}{l} u+v=2x \\ u-v=-2y \end{array} \right.$$




$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$


$$I = \iint_{O'} e^{u/v} \cdot \frac{1}{2} du dv = \int_0^1 \int_{-v}^v e^{u/v} \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{e^{u/v}}{\frac{1}{v}} \Big|_{-v}^v \right) dv$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 v \cdot (e - e^{-1}) dv = \frac{1}{2} (e - \frac{1}{e}) \cdot \frac{v^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{4} (e - \frac{1}{e})$$

* $z = 4 - x^2 - y^2$ paraboloidi ve $z \geq 0$ in sınırladığı bölgenin hacmini 2 katlı integral ile hesaplayın.



$O: x^2 + y^2 = 4$



$x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$
 $|z| = r$
 $dx dy = r dr d\theta$


$$V = \iint_0 (4 - x^2 - y^2) dx dy = \iint_0 (4 - r^2) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r - r^3) dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(2r^2 - \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 \right) d\theta$$

$$= \frac{8\pi}{1}$$

4-a) R bölgesi, xy -düzleminde, $y=x$, $y=x^3$, $x \geq 0, y \geq 0$ ile sınırlı bir bölge olsun. $f(x,y) = e^{2x^2-x^4}$ fonksiyonunun R bölgesi üzerinde ortalama değerini hesaplayınız. (R bölgesini çiziniz) (12 Puan)



$$\text{Ort. Değer} = \frac{1}{R \text{ nin Alanı}} \iint_R f \, dA$$

$$\iint_R dA = \int_0^1 \int_{x^3}^x dy \, dx = \int_0^1 \int_y^{\sqrt[3]{y}} dx \, dy = \frac{1}{4} \quad (5)$$

$$\iint_R e^{2x^2-x^4} dA = \int_0^1 \int_{x^3}^x e^{2x^2-x^4} dy \, dx = \int_0^1 e^{2x^2-x^4} (x-x^3) dx = \int_0^1 \frac{1}{4} e^u du = \frac{1}{4}(e-1) \quad (5)$$

$$\text{Ortalama Değer} = \frac{1}{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{4} (e-1) = e-1 \quad (2)$$

4-b) R bölgesi, $2x^2+6xy+5y^2=1$ ile sınırlı bir bölge ise, $x=2u-v$ ve $y=-u+v$ dönüşümünü yaparak,

$\iint_R \sqrt{2x^2+6xy+5y^2} \, dx \, dy$ integralini hesaplayınız. (13 Puan)

$$2x^2+6xy+5y^2=1$$

$$2(2u-v)^2 + 6(2u-v)(-u+v) + 5(-u+v)^2 = 1$$

$$2(4u^2 - 4uv + v^2) + 6(-2u^2 + 2uv + uv - v^2) + 5(u^2 - 2uv + v^2) = 1$$

$$8u^2 - 8uv + 2v^2 - 12u^2 + 18uv + 6v^2 + 5u^2 - 10uv + 5v^2 = 1$$

R' , $u^2+v^2=1$, R eliptik bölge, yarıçapı 1 olan daireye dönüştü. (2)



$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = 1 \quad dx \, dy = |J| \, du \, dv \Rightarrow dx \, dy = du \, dv \quad (2)$$

$$\iint_R \sqrt{2x^2+6xy+5y^2} \, dx \, dy = \iint_{R'} \sqrt{u^2+v^2} \, du \, dv = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 r \cdot r \, dr \, d\theta \quad (4)$$

$$\begin{aligned} u &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

$$= \frac{2\pi}{3} \quad (1)$$



* $y = x^2 + z^2$ paraboloidinin $y=1$ ile kesilmesi ile oluşan cismin hacmi?



$x = r \cos \theta$
 $z = r \sin \theta$
 $dx dz = r dr d\theta$
 $x^2 + z^2 = r^2$

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - (x^2 + z^2)) dx dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{2} //
 \end{aligned}$$



* $x^2 + z^2 = 9$, $y=2$, $y=0$, $z=0$, $x=0$ arasındaki cismin hacmi?



$x = r \cos \theta$
 $z = r \sin \theta$
 $dx dz = r dr d\theta$

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^2 \int_0^{\pi/2} 2 dx dz = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 2r dr d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} r^2 \Big|_0^3 d\theta = \int_0^{\pi/2} 9 d\theta = \frac{9\pi}{2}
 \end{aligned}$$


* $x^2 + y^2 = 36$ silindir, $z^2 = x^2 + y^2$ koni, $z \geq 0$ arasında kalan hacim?



$x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$
 $x^2 + y^2 = r^2$
 $dx dy = r dr d\theta$

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{2\pi} \int_0^6 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^6 r^2 \cdot r dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^4}{4} \Big|_0^6 \right) d\theta \\
 &= \frac{6^4}{4} \cdot 2\pi \\
 &= 144\pi
 \end{aligned}$$

* xy düzleminin üstünde, $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve $x^2 + y^2 = 4$ silindiri arasındaki cismin hacmi?




$$V = \iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^2 d\theta$$


$$= \underline{\underline{8\pi}}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned} \right\}$$

* $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresinin hacmini bulunuz.



izdüşüm bölgesi: $D: x^2 + y^2 = 4$



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 - r^2 &= u \\ r dr &= -\frac{du}{2} \\ r=2 &\rightarrow u=0 \\ r=0 &\rightarrow u=4 \end{aligned}$$

$$\frac{V}{2} = \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} \cdot r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^4 -\frac{r}{2} du d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} d\theta = \frac{16\pi}{3} \Rightarrow V = \frac{32}{3}\pi$$

* $x^2 + y^2 - 4x = 0, z \geq 0, x^2 + y^2 = z^2$ arasında kalan hacmi veren 2 katlı integrali kutupsal dönüşüm ile yazınız.




$$V = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \theta} r \cdot r dr d\theta$$

$$D: x^2 + y^2 - 4x = 0 \rightarrow (x-2)^2 + y^2 = 4$$

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4x &= 0 \\ \downarrow \\ r^2 &= 4r \cos \theta \\ r=0 \quad r &= 4 \cos \theta \end{aligned}$$




$$\textcircled{*} \int_{-1}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \frac{x}{y} dx dy$$

a) integrasyon sırasını deđiştirir \Rightarrow

b) $x^2+y^2=u$
 $y^2=v$ dönüşümü ile çözün.


$$\left. \begin{array}{l} y=\sqrt{3} \quad y=1 \\ x=\sqrt{4-y^2} \quad x=-1 \end{array} \right\} \text{O bölgesi}$$



$$\Rightarrow \int_{-1}^{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x}{y} dy dx + \int_{-1}^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x}{y} dy dx$$

$$\text{b) } \begin{array}{l} \text{O} \quad \quad \quad \text{O}' \\ y=\sqrt{3} \rightarrow v=3 \\ y=1 \rightarrow v=1 \\ x^2+y^2=4 \rightarrow u=4 \\ x=-1 \rightarrow u=v+1 \end{array}$$

$$|J| = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \frac{1}{\left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right|} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 0 & 2y \end{vmatrix}} = \frac{1}{4xy}$$



$$\iint_{\text{O}' } \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{4xy} du dv = \iint_{\text{O}' } \frac{1}{4y^2} du dv = \iint_{\text{O}' } \frac{1}{4v} du dv = \frac{1}{4} \int_1^3 \int_{v+1}^4 \frac{1}{v} dv du = -\frac{1}{2} (1 - 3 \ln \sqrt{3})$$

$\textcircled{*} \sqrt{(2,01)^2 + (1,95)^2}$ sayısını 2. mertebe Taylor açılımı ile yaklaşık olarak hesaplayın.

$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ $(a,b) = (2,1)$ olsun.

$$f_x = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} \quad f_y = \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} \quad f_{xx} = \frac{6x \cdot 2\sqrt{x^2+y^2} - 3x^2 \cdot 2}{4(x^2+y^2)} \cdot \frac{3x^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$f_{yy} = \frac{\sqrt{x^2+y^2} - y \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{(x^2+y^2)} \quad f_{yx} = - \frac{y \cdot \frac{3x^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$$

$$f_x(2,1) = 2 \quad f_y(2,1) = \frac{1}{3} \quad f_{xx}(2,1) = \frac{2}{3} \quad f_{yx}(2,1) = -\frac{2}{9} \quad f_{yy}(2,1) = \frac{8}{27}$$

$$f(x,y) \approx 3 + 2(x-2) + \frac{1}{3}(y-1) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot (x-2)^2 + 2 \cdot \left(-\frac{2}{9}\right) \cdot (y-1)(x-2) + \frac{8}{27} (y-1)^2 \right)$$

$$f(2,0,1,95) \approx 3 + 2 \cdot (0,01) + \frac{1}{3} \cdot (0,95) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot (0,01)^2 - \frac{4}{9} (0,01) \cdot (0,95) + \frac{8}{27} (0,95)^2 \right) = 3,45$$

3-a) $\sin[\pi(0.01)(1.05) + \ln(1.05)]$ nin yaklaşık değerini toplam diferansiyel veya lineer yaklaşım kullanarak hesaplayınız. (12 Puan)

$$f(x,y) = \sin(\pi xy + \ln y) \quad f(0,1) = 0 \quad h = \Delta x = 0.01 \\ k = \Delta y = 0.05$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \pi y \cos(\pi xy + \ln y), \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial x} = \pi$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \left(\pi x + \frac{1}{y}\right) \cos(\pi xy + \ln y) \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial y} = 1$$

$$f(0,01; 1,05) \approx f(0,1) + 0,01 \cdot \pi + 0,05 \cdot 1 \approx 0,021416$$

3-b) $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{8}{y}$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız. (13 Puan)

bulunuz. (13 Puan)

$$\left. \begin{aligned} f_x = y - \frac{1}{x^2} = 0 &\Rightarrow y = \frac{1}{x^2} \\ f_y = x - \frac{8}{y^2} = 0 &\Rightarrow x = \frac{8}{y^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = \frac{8}{(\frac{1}{x^2})^2} \Rightarrow x - 8x^4 = 0 \\ x=0 \quad x = \frac{1}{2} \\ \text{Kritik N.}$$

$$x=0 \notin D_f$$

$P(\frac{1}{2}, 4)$ için


$$f_{xx} = \frac{2}{x^3} \quad f_{yy} = \frac{16}{y^3} \quad f_{xy} = 1$$

$$f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = \frac{1}{(\frac{1}{2})^3} \cdot \frac{16}{4^3} - 1 = 3 > 0$$

$$f_{xx} = 16 > 0$$

$\Rightarrow P(\frac{1}{2}, 4)$ lokal min noktadır.

4-a) $\int_1^2 \int_{1/2}^{1/y} e^{\ln x - x} dx dy$ integralini, integral sırasını değiştirerek hesaplayınız. (12 Puan)




$$I = \int_{x=1/2}^1 \left(\int_{y=1}^{1/x} e^{\ln x - x} dy \right) dx$$

$$= \int_{1/2}^1 e^{\ln x - x} \left. \frac{1}{y} \right|_1^{1/x} dx$$

$$= \int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^{\ln x - x} dx = e^{\ln x - x} \Big|_{1/2}^1 = 1 \cdot e^{-1} - \frac{1}{2} e^{-1/2} = \frac{1}{e} - \frac{1}{2\sqrt{e}}$$

4-b) R bölgesi $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$ olmak üzere $\iint_R \arctan\left(\frac{y}{x}\right) dA$ integralini hesaplayınız.


(R bölgesinin şeklini çiziniz). (13 Puan)




$$\iint_R \arctan\left(\frac{y}{x}\right) dx dy = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} \theta d\theta \int_{r=1}^{r=2} r dr = \frac{3\pi^2}{64}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \end{array}$$

* E cismi $x^2+y^2=1$ silindirin içinde, $z=4$ düzleminin altında, $z=1-x^2-y^2$ paraboloidinin üstündedir. Cismin hacmini bulunuz.



izdüşüm bölgesi: $x^2+y^2=1$



D: $x^2+y^2=1$



$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \\ x^2+y^2 &= r^2 \end{aligned} \right\}$$

$$V = \iint_0 (4 - (1-x^2-y^2)) dx dy = \iint_0 (3+r^2) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (3r+r^3) dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{3}{2}r^2 + \frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{7}{4} d\theta = \underline{\underline{\frac{7}{2}\pi}}$$

* $5=z+y$ düzleminin altında, xy düzleminin üstünde, $x^2+y^2=2$ ve $x^2+y^2=1$ silindiri arasında kalan cismin hacmi?




$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned} \right\}$$

$$V = \iint_0 (5-y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{2}} (5-r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} + \frac{1-2\sqrt{2}}{3} \sin \theta \right) d\theta$$

$$= \frac{5}{2} \theta - \frac{1-2\sqrt{2}}{3} \cos \theta \Big|_0^{2\pi} = \underline{\underline{\frac{5\pi}{2}}}$$

* $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, $3z \geq x^2 + y^2$ arasında kalan hacim?



$$z^2 + 3z = 4 \rightarrow \boxed{z=1} \\ z=-4 \times$$

$$D: z=1 \rightarrow \underline{x^2 + y^2 = 3}$$



$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned} \right\} dx dy = r dr d\theta$$

$$V = \iiint_D (\sqrt{4-x^2-y^2} - \frac{x^2+y^2}{3}) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} (\sqrt{4-r^2} - \frac{r^2}{3}) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{(4-r^2)^{3/2}}{3} - \frac{r^4}{12} \right]_0^{\sqrt{3}} d\theta = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{8}{3} \right) d\theta = \frac{19}{12} \cdot 2\pi = \underline{\underline{\frac{19}{6}\pi}}$$

* D: 1. bölgede $y = 4 - x^2$ parabolü, $x=0$ ve $y=0$ doğruları arasında kalan bölge ise $I = \iint_D \frac{x e^{2y}}{4-y} dA = ?$



$$I = \iint_D \frac{x e^{2y}}{4-y} dx dy \Rightarrow$$

(x 'e göre düzenli bölge alınırsa integral çözülmez: $\iint_D \frac{x e^{2y}}{4-y} dy dx$)
çözülmez

$$I = \int_0^4 \int_0^{\sqrt{4-y}} \frac{x e^{2y}}{4-y} dx dy = \int_0^4 \frac{x^2 e^{2y}}{2(4-y)} \Big|_0^{\sqrt{4-y}} dy = \int_0^4 \frac{(4-y) e^{2y}}{2(4-y)} dy$$

$$= \frac{e^{2y}}{2} \Big|_0^4 = \frac{e^8 - 1}{2}$$

YTÜ - Final Sınav Soru ve Cevap Kağıdı				NOT TABLOSU				
				1. S	2. S	3. S	4. S	Σ
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası		Grup No						
Bölümü				Sınav Tarihi		05.06.2017		
Dersin Adı		MAT1072 MATEMATİK II		Sınav Süresi	90dk	Sınav Yeri		
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı						İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanununun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

S. 1-a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$ serisinin toplamını bulunuz. (12 P)

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1 //$$

S. 1-b) Diferansiyel yaklaşımı kullanarak, $\sqrt{(2.06)^2 + 5(0.97)^4}$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız. (13 P)

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + 5y^4}$$

$$a=2, \quad \Delta x = 0.06$$

$$b=1, \quad \Delta y = -0.03$$

$$f(2,1) = \sqrt{4+5} = 3$$


$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5y^4}} \Big|_{(2,1)} = \frac{2}{3}$$

$$f_y = \frac{10y^3}{\sqrt{x^2 + 5y^4}} \Big|_{(2,1)} = \frac{10}{3}$$

$$f(a+\Delta x, b+\Delta y) \approx f(a,b) + f_x(a,b) \Delta x + f_y(a,b) \Delta y$$

$$\sqrt{(2.06)^2 + 5(0.97)^4} \approx 3 + \frac{2}{3}(0.06) + \frac{10}{3}(-0.03) = 2.94 //$$

S. 4-a) $y = \ln x$ eğrisi, $y = 0$, $y = 2$ doğruları ve y -ekseni ile sınırlanmış bölgenin **alanını**, *iki katlı integral* ile hesaplayınız. (13 P)



1. YOL : $A = \int_0^2 \int_0^{e^y} dx dy$

$A = \int_0^2 e^y dy = (e^2 - 1) br^2 //$


2. YOL : $A = \int_0^1 \int_0^2 dy dx + \int_1^{e^2} \int_{\ln x}^2 dy dx = 2 + \int_1^{e^2} (2 - \ln x) dx$

$A = 2 + [x(2 - \ln x) + x] \Big|_1^{e^2}$

$A = 2 + [e^2(2 - 2) + e^2 - 2 - 1] = e^2 - 1 //$


$\int (2 - \ln x) dx = x(2 - \ln x) + \int dx = x(2 - \ln x) + x + C$
 $2 - \ln x = u$; $dv = dx$
 $-\frac{1}{x} dx = du$; $v = x$

S. 4-b) $z = 0$ ve $z = y$ düzlemleri ve $x^2 + y^2 = 4$ silindiri ile oluşturulmuş cismin, xy -düzleminin üstünde kalan kısmının **hacmini** *iki katlı integral* ile bulunuz. (12 P)



$V = \iint_D y dA = \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} y dy dx = \int_{-2}^2 \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{4-x^2}} dx$

$V = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{1}{2} (4x - \frac{x^3}{3}) \Big|_{-2}^2 = \frac{16}{3} br^3 //$



2. YOL $V = \iint_D y dA = \int_0^\pi \int_0^2 r \sin \theta r dr d\theta$

$V = \int_0^\pi \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 \sin \theta d\theta = \frac{8}{3} (-\cos \theta) \Big|_0^\pi$

$V = \frac{8}{3} (1 + 1) = \frac{16}{3} br^3 //$

S. 3-a) $f(x, y) = e^y \sin(y^2 - x)$ ile tanımlı f fonksiyonunun $(\pi, 0)$ noktasındaki **yönlü** türevi, hangi yönlerde sıfır olur? (11 P)

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$$

$$\nabla f = \langle -e^y \cos(y^2 - x), e^y \sin(y^2 - x) + 2ye^y \cos(y^2 - x) \rangle$$

$$\nabla f(\pi, 0) = \langle 1, 0 \rangle$$


$$\vec{u} = \langle a, b \rangle \text{ ve } a^2 + b^2 = 1 \text{ olsun.}$$

$$D_{\vec{u}} f(\pi, 0) = \nabla f(\pi, 0) \cdot \vec{u} = a = 0 \Rightarrow b = \pm 1$$

$$\vec{u} = \langle 0, \pm 1 \rangle \text{ veya } \vec{u} = \pm \vec{j}$$

S. 3-b) $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+3x^3}} dy$ integralini hesaplayınız. (14 P)

$$\begin{cases} y=0, y=1 \\ x=\sqrt{y}, x=1 \end{cases}$$



$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+3x^3}} dy = \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+3x^3}} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+3x^3}} y \Big|_0^{x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+3x^3}} dx = \frac{2}{9} \sqrt{1+3x^3} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} (2-1) = \frac{2}{9} //$$

$$\left[\begin{array}{l} 1+3x^3 = t^2 \\ 9x^2 dx = 2t dt \end{array} ; \int \frac{x^2}{\sqrt{1+3x^3}} dx = \frac{2}{9} \int \frac{t dt}{t} = \frac{2}{9} t + C \right. \\ \left. = \frac{2}{9} \sqrt{1+3x^3} + C \right]$$